

Se buscan los barrenadores gigantes de la palma de aceite: *Eupalamides guyanensis* y *Eupalamides cyparissias*



Hace un tiempo, este palmicultor no conocía los daños que ocasionan los barrenadores gigantes de la palma de aceite y desatendió las recomendaciones de mejorar las labores de poda y cosecha.



Plantación sin poda

Que no le pase a usted

>> No se atrase en la poda: realice esta labor semestralmente y de manera correcta

Dejar bases peciolares demasiado largas (cachos):

- ◆ Dificulta la cosecha.
- ◆ Facilita que las hembras de *Eupalamides* pongan allí sus huevos y que la plaga se reproduzca.

>> Coseche cada ocho días y no deje la estrella

- ◆ Dejar racimos maduros facilita que la plaga se reproduzca.
- ◆ Al cosechar, no deje la base del racimo ni espigas adheridas a la palma (estrella): allí se alimentan las larvas de *Eupalamides* en sus primeros estadios.



Poda incorrecta



Cosecha incorrecta

Autores

Rosa Cecilia Aldana de la Torre
Anuar Morales Rodríguez
Área de Entomología

Ángela Lucero Neira Segura
Programa de Manejo Fitosanitario




Programa de
Manejo Fitosanitario
Programa de Plagas
y Enfermedades



Se buscan los barrenadores gigantes de la palma de aceite: *Eupalamides guyanensis* y *Eupalamides cyparissias*



Pese a no conocer estas plagas, este palmicultor estudió y preparó a su equipo técnico. Pasó de una captura masiva de adultos de *Eupalamides* a unos cuantos y pudo reducir las pérdidas económicas.



Escanee el código QR con su celular para más información



Siga el buen ejemplo de este palmicultor



»» Poda semestralmente

Verifique que los cortes de las hojas se hagan a ras del estípote.



»» Cosecha cada ocho días

Recuerde que el corte de cosecha debe hacerse por debajo de la base del racimo.



Sensibilice y capacite al personal sobre la importancia de la calidad en las labores de poda y cosecha.



Programa de Manejo Fitosanitario
Programa de Plagas y Enfermedades

